

## جداسازی باکتریهای بومی تولید کننده آنزیم کلاستروول اکسیداز از خاک، آب، پساب کارخانه های چرم و پوست، صابون سازی و فراورده های لبنی

حامد اسمعیل لشکریان<sup>۱</sup>، کیانا شاه زمانی<sup>۲</sup>، جمشید راهب<sup>۳</sup>

۱- استادیار، گروه بیوشیمی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

۲- استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

۳- دانشیار، گروه باکتروبیوس، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران.

یافته / دوره پانزدهم / شماره ۱ / بهار ۹۲ / مسلسل ۵۵

### چکیده

دریافت مقاله: ۹۱/۹/۳۰ ، پذیرش مقاله: ۹۱/۱۲/۱۱

\* مقدمه: کلاستروول اکسیداز آنزیمی است که اکسیداسیون کلاستروول را همراه با احیای اکسیژن مولکولی به پراکسید هیدروژن انجام می دهد. این آنزیم توسط برخی میکروارگانیسم های بیماریزا و غیر بیماریزا تولید می شود و از مهمترین آنزیم های تجاری دنیاست که کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. هدف از این مطالعه جداسازی باکتریهای بومی مولد کلاستروول اکسیداز و تعیین هویت آنها با استفاده از روشهای میکروبی، بیوشیمیایی و ژنتیکی می باشد.

\* مواد و روش ها: تعداد ۱۸۷ نمونه از پساب کارخانه چرم و پوست و صابون سازی، خاک، لبنیات و آب های راکد جمع آوری گردید. پس از کشت نمونه ها، باکتریهای رشد یافته با تست های میکروبی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردید. برای تایید فعالیت کلنی های مولد آنزیم کلاستروول اکسیداز، روشهای رنگ سنجی و قهوه ای نمودن محیط کشت استفاده شد. از تکنیک PCR 16s rRNA برای تایید قطعی سویه های بدست آمده استفاده شد.

\* یافته ها: از ۱۸۷ نمونه، تنها ۲ باکتری از خاک جداسازی گردید و نتایج نشان داد که متعلق به گونه رودوکوکوس می باشند. همچنین در آزمایش قهوه ای نمودن و رنگ سنجی، فعالیت کلاستروول اکسیدازی هر دو باکتری تایید شد. هویت مولکولی سویه های مزبور با تعیین توالی ژن 16s rRNA تایید شد.

\* بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه، باکتریهای بومی مولد کلاستروول اکسیداز جدا گردید. این دو باکتری بواسطه خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و روشهای تایید مولکولی جزء گونه *Rhodococcus* طبقه بندی گردید.

\* واژه های کلیدی: کلاستروول اکسیداز، رودوکوکوس، جداسازی.

آدرس مکاتبه: خرم آباد، پردیس کمالوند دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پزشکی گروه بیوشیمی و ژنتیک

پست الکترونیک: hamedesmaili@gmail.com

## مقدمه

آنزیم کلسترول اکسیداز<sup>۱</sup> آنزیمی است که اکسیداسیون کلسترول را همراه با احیای اکسیژن مولکولی به پراکسید هیدروژن انجام می‌دهد (۱،۲). آنزیم کلسترول اکسیداز توسط دو دسته باکتری تولید می‌شود، الف: باکتری‌های غیربیماریزا که کلسترول را بعنوان منبع کربن استفاده می‌کنند و ب: باکتریهای بیماریزا که برای آلوده کردن ماکروفاژهای میزبان به کلسترول اکسیداز نیاز دارد و با تبدیل کلسترول به-cholest-4-en-3-one قادر به تغییر ساختار فیزیکی غشای لیپیدی هستند. هر دو دسته باکتری (بیماریزا و غیر بیماریزا) در حضور کلسترول قادر به تولید کلسترول اکسیداز می‌باشند (۳).

این آنزیم در میکروارگانیسم‌های تولیدکننده به شکل‌های داخل سلولی، خارج سلولی و یا متصل به غشا یافت می‌شود. بعضی سویه‌های مولد این آنزیم تنها یک شکل و بعضی هر دو شکل داخل سلولی و خارج سلولی کلسترول اکسیداز را تولید می‌کنند (۵،۴). بعنوان مثال باکتری‌های نوکاردیوفورم<sup>۲</sup>، نوکاردیا<sup>۳</sup> و رودوکوکوس<sup>۴</sup> اغلب نوع متصل به غشا را تولید نمایند البته برخی از سویه‌های رودوکوکوس توانایی تولید شکل خارج سلولی آنزیم را نیز دارند (۷،۶).

آرتروباکتر<sup>۵</sup>، رودوکوکوس اکویی<sup>۶</sup>، مایکوباکتریوم<sup>۷</sup>، نوکاردیا اریتروپولیس<sup>۸</sup> و نوکاردیا رودوکروس<sup>۹</sup> نوع داخل سلولی و یا متصل به غشا را تولید می‌کنند (۸،۴). آنزیم کلسترول اکسیداز از مهمترین آنزیمهای تجاری دنیاست که کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. از مهمترین کاربردهای آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- سنجش میزان کلسترول: تعیین میزان کلسترول در سرم خون از اولین و مهمترین کاربردهای این آنزیم می‌باشد. امروزه روشهای آنزیمی بخاطر مزایایی که نسبت به روش شیمیایی دارند، جایگزین روش شیمیایی شده‌اند. روش آنزیمی

اختصاصی تر، سریعتر و راحت‌تر از روش شیمیایی است و با عوامل سرمی تداخل کمتری دارد (۹،۵). همچنین در این روش بجز سنجش کلسترول آزاد سرمی در حضور آنزیم کلسترول استراز می‌توان کل کلسترول سرم را اندازه‌گیری نمود. علاوه بر تعیین کلسترول سرم از روش آنزیمی برای تعیین کلسترول مواد غذایی نیز استفاده می‌شود (۱۰).

۲- صنایع دارویی: داروهای استروئیدی بخش مهمی از داروها را تشکیل می‌دهند. در فرآیند تهیه آنها از تبدیلات میکروبی و آنزیمها استفاده می‌شود. آنزیم کلسترول اکسیداز که اولین آنزیم در تجزیه کلسترول است، آنزیم مهم در تهیه این داروها می‌باشد (۱۱).

۳- اثر حشره‌کشی: کشف پروتئین‌های حشره‌کش جدید برای کنترل آفات و استفاده در محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است، از مهمترین این پروتئین‌ها می‌توان به پروتئینهای باسیلوس ترنجنسیس<sup>۱۰</sup> اشاره نمود. با انتقال ژن این پروتئینها به گیاهان اثر حشره‌کشی آنها را می‌توان به گیاهان منتقل نمود. البته واضح است که بسیاری از حشرات به پروتئینهای این باکتری حساسیت ندارند (۱۲).

با توجه به خروج سالانه مقادیر هنگفتی ارز از کشور برای خرید آنزیم کلسترول اکسیداز و نظر به کاربرد وسیع این آنزیم در صنایع، کشاورزی، پزشکی، پروژه‌های تحقیقاتی علوم پایه و

1. Cholesterol: O<sub>2</sub>Oxidoreductase, EC 1.1.3.6

2. Nocardioform

3. Nocardia

4. Rhodococcus

5. Arthrobacter

6. Rhodococcus equi

7. Mycobacterium

8. Nocardia erythropolis

9. Nocardia rhodochorou

10. Bacillus thuringiensis

جهت تعیین هویت، آزمایشات مختلف اعم از: رنگ آمیزی گرم، تستهای کاتالاز، اکسیداز، حرکت، اوره، لاکتوز، گلوکز، ساکارز، گزیلوز، رشد بر روی بلاد آگار و رشد بر روی مک کانکی آگار انجام شد.

### تائید فعالیت کلاستروکسیداز باکتری

به منظور انتخاب کلنی های مولد کلاستروکسیداز، از دو روش رنگ سنجی و قهوه ای نمودن محیط کشت استفاده شد. در روش رنگ سنجی یک محلول شامل ۰/۵٪ کلاستروکسیداز، ۱/۷۶٪ ۴-آمینوآنتی پیرین، ۰/۶٪ فنل و ۳۰۰۰ U/lit آنزیم HRP<sup>۱</sup> (در بافر فسفات پتاسیم ۰/۱ M با pH = ۷ آماده شد. سپس یک کاغذ صافی آغشته به محلول فوق، روی کلنی های رشد یافته بر روی پلیت قرار گرفته و پلیت ها بمدت یک شب در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد انکوبه گردید. فعالیت کلاستروکسیداز کلنی های مورد آزمایش با تولید رنگ قرمز ناشی از تشکیل کوئینون امینین<sup>۲</sup> تائید شد. سپس سویه های مولد رنگ قرمز، جمع آوری شد. در آزمایش قهوه ای نمودن محیط کشت، پلیت محیط کشت با اضافه نمودن مواد زیر شامل: کلاستروکسیداز، یک گرم تریتون ۱۰۰-X، ۰/۱ گرم او-دیانیزیدین<sup>۳</sup>، ۱۰۰۰۰ واحد در لیتر آنزیم پراکسیداز در یک لیتر آگار تهیه شد. در این روش کلاستروکسیداز به داخل سلولهای باکتریایی نفوذ کرده، منتشر می شود. باکتری بواسطه داشتن آنزیم کلاستروکسیداز، کلاستروکسیداز را تجزیه نموده و پراکسید هیدروژن تولید می نماید که این ماده با معرف پراکسیداز واکنش داده، ترکیب آزو<sup>۴</sup> شکل می گیرد و رنگ محیط کشت به رنگ قهوه ای در می آید (۱۳).

آزمایشگاه های تشخیص طبی؛ جداسازی میکروب های مولد این آنزیم بسیار ضروری بنظر میرسد. هدف اصلی این مطالعه، جدا سازی باکتری های بومی تولید کننده آنزیم کلاستروکسیداز و تائید مولکولی سویه های بدست آمده می باشد.

### مواد و روش ها

#### جمع آوری و آماده سازی نمونه جهت کشت میکروبی

تعداد ۱۸۷ نمونه شامل لبنیات ( شیر، کره محلی، سرشیر)، پساب کارخانه چرم و پوست، پساب کارخانجات صابون سازی، خاک ( باغچه، اطراف مراکز جمع آوری زباله ) و آب های راکد از شهرهای اصفهان، اهواز، بروجرد، تبریز، تهران، خرم آباد، دزفول، مراغه، مشهد و ملایر جمع آوری گردید.

جهت جداسازی بهتر باکتری از نمونه ها، ابتدا یک گرم از نمونه های جامد یا یک میلی لیتر از نمونه های مایع در صد میلی لیتر آب مقطر به حالت سوسپانسیون در آمده و به مدت ۳۰ دقیقه روی شیکر مخلوط شد.

#### کشت نمونه ها جهت بدست آوردن باکتری

مقدار ۰/۱ میلی لیتر از محلول رویی، بر روی محیط کشت مینرال آگار تلقیح شد و بمدت ۷ تا ۱۲ روز در انکوباتور ۳۰ درجه سانتی گراد انکوبه گردید. محیط کشت فوق حاوی کلاستروکسیداز بعنوان منبع کربن بود.

بعد از اتمام مدت زمان انکوباسیون، تعدادی از کلنی های رشد یافته در محیط کشت مینرال آگار حاوی عصاره مخمر تلقیح شده بمدت ۳ تا ۵ روز در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد انکوبه شد. در مرحله بعد، کلنی های گرم رنگ و موکوئیدی حاصل برای تعیین هویت میکروبی و بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتند.

#### تعیین هویت میکروب های جدا شده

1. Horse Radish Peroxidase
2. Quinoneimine dye
3. O-dianisidine
4. AZO Compound

## تعیین هویت مولکولی باکتری

## استخراج DNA باکتری

ابتدا باکتری در محیط LB مایع کشت داده شده و به مدت ۱۶ تا ۲۰ ساعت در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  و دور  $185\text{rpm}$  در انکوباتور شیکردار گذاشته شد. مقدار  $1/5$  میلی لیتر از محیط کشت حاوی باکتری رشد یافته به درون میکروتیوبها ریخته و در دور  $12000\text{rpm}$  به مدت یک دقیقه سانتریفوژ گردید. محلول رویی تخلیه شد و از رسوب سلولی جهت استخراج DNA ژنومی از کیت استخراج DNA شرکت متابیون<sup>۱</sup> استفاده شد. سپس DNA ژنومی باکتری در فریزر  $20^{\circ}\text{C}$  - نگهداری شد.

## تکثیر ژن 16s rRNA با استفاده از تکنیک PCR

برای انجام آزمایش 16S rRNA-PCR از پرایمرهای استاندارد (1492R و 27F) استفاده شد. پرایمرهای مزبور هویت باکتریهای جداسازی شده را تا حد گونه مشخص می نماید. توالی پرایمرهای مزبور عبارتند از:

Primer 27F: 5' – AGAGTTTGATCMTGGCTC-3'  
Primer 1492R: 5'-ACGGYTACCTTGTTACGACT-3'

مخلوط واکنش برای آزمایش PCR به شرح ذیل بود:

بافر  $10\times$ :  $2/5$  میکرولیتر

آب دیونیزه:  $11/25$  میکرولیتر

$\text{MgCl}_2$ :  $7/5$  میکرولیتر ( $1/5$  میلی مولار)

dNTP:  $5$  میکرولیتر ( $2$  میلی مولار)

از هر پرایمر:  $1$  میکرولیتر ( $5$  میلی مولار)

Taq DNA Polymerase:  $1$  میکرولیتر ( $2$  واحد)

DNA استخراج شده:  $3$  میکرولیتر

ژن 16s rRNA در شرایط زیر و با استفاده از دستگاه

گرادیانت ترموسایکلر (اپندورف) تکثیر شد.

}	۹۵ °C - ۴ دقیقه
	۹۴ °C - ۴۵ ثانیه
	۵۶ °C - ۴۵ ثانیه
	۷۲ °C - ۶۰ ثانیه
	۷۲ °C - ۳ دقیقه

۳۰ چرخه

پس از انجام واکنش PCR، محصول برای تأیید اولیه روی ژل آگاروز  $1/0/8$  الکتروفورز شد. الکتروفورز قطعات همراه با نشانگرهای وزن مولکولی (مارکر) انجام گردید و تصویر ژل با دستگاه Gel Doc برداشته شد. در مرحله بعدی، فرآورده های حاصل از آزمایش PCR برای تعیین توالی به شرکت ژن فن آوران ارسال شد.


## یافته ها

## جداسازی باکتری از نمونه های کشت شده

از منابع خاک اطراف حوضچه های کارخانجات چرم و پوست، خاک باغچه، آب، خاک حوضچه های صابون سازی سنتی و لبنیات محلی شامل: شیر، کره و سرشیر، تعداد ۱۸۷ نمونه جمع آوری شد (جدول ۱). از میان آنها تعداد ۲ دو نمونه میکروبی جداسازی گردید که هر دو نمونه باکتری از نمونه های خاک جدا شد.

## تعیین هویت میکروبیهای جدا شده

بر روی نمونه های بدست آمده آزمایش رنگ آمیزی گرم انجام شد که در نهایت مشخص گردید که هر دو باکتری جدا شده، کوکوباسیل گرم مثبت می باشند (شکل ۱).



شکل ۱. تصویر باکتری گرم مثبت رشد یافته بر روی محیط کشت مینرال که حاوی کلاستروول به عنوان تنها منبع کربن میباشد. باکتریها به صورت کوکوباسیل های گرم مثبت چسبیده به هم دیده می شوند.

جدول ۱. محل ها و نمونه های اخذ شده جهت آماده سازی و کشت میکروبی

نوع نمونه محل نمونه برداری	خاک باغچه	خاک اطراف حوضچه های چرم و پوست	آبهای کشاورزی و سطحی	شیر	سر شیر	کره	پساب صابون سازی سنتی	خاک اطراف مراکز جمع آوری زباله
اصفهان	۴	۷	-	-	-	-	۲	-
اهواز	-	-	-	۳	۲	۵	-	-
بروجرد	۳	-	-	-	-	-	۷	-
تبریز	۶	۷	۵	-	-	-	۱۰	-
تهران	۱۸	۱۲	-	-	-	-	-	۲۰
خرم آباد	۴	۵	۱۰	۳	۲	۴	-	-
دزفول	-	-	-	۴	۳	۲	-	-
مراغه	۲	-	-	۵	-	-	۸	-
مشهد	-	۸	-	-	-	-	-	-
ملایر	۵	-	-	۳	۲	-	۶	-

جدول ۲. نتایج آزمایش های بیوشیمیایی تعیین هویت باکتری های جدا شده از نمونه خاک

Test	Result	Test	Result
Oxidase	positive	Gram reaction	Positive
Catalase	positive		
Tween 20	positive		
Urease	Negative		
Nitrate Reduction	Negative		
Indole production	Negative		
Motility	positive		
MR	Negative		
VP	Negative		
CAMP test	positive	Growth in MacConkeymedium	NO growth
Xylose	Negative	Growth in Blood agar	Mucoid colonies formation
OF test	Negative	Haemolysis	Negative
Glucose	Negative	Starch hydrolysis	Negative
Lactose	Negative	DNase	Negative
Sucrose	Negative		

گزارش گردید که حاکی از اکسید شدن و استفاده کلاستروکسیداز توسط باکتری جدا شده بود. (شکل های ۲ و ۳).



شکل ۲. قهوه ای شدن محیط کشت توسط باکتری های *Rhodococcus* sp.501,502 مولد آنزیم کلاستروکسیداز.

با توجه به تستهای انجام شده بیوشیمیایی جهت شناسایی و جداسازی باکتریهای گرم مثبت نتایج ذیل بدست آمد (جدول ۲).

### آزمایشهای بیوشیمیایی تعیین هویت باکتری

#### تأیید فعالیت کلاستروکسیداز باکتری

جهت تأیید مصرف کلاستروکسیداز محیط کشت بوسیله باکتری، در محیط کشت مینرال حاوی کلاستروکسیداز به عنوان تنها منبع کربن سوختن های جدا شده کشت گردید و آزمایش های قهوه ای کردن محیط کشت و رنگ آمیزی کلنی<sup>۱</sup> انجام شد. در هر دو آزمایش نتیجه مثبت

1. Colony staining Method

*Rhodococcus sp. 501*

Taxonomy ID: 634766 Inherited blast name: high GC Gram+

Rank: species Genetic code: [Translation table 11](#) (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)

Lineage( full )

[cellular organisms](#); [Bacteria](#); [Actinobacteria](#);[Actinobacteria](#) (class); [Actinobacteridae](#);[Actinomycetales](#); [Corynebacterineae](#);[Nocardiaceae](#); *Rhodococcus*

بررسی توالی های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Blast n

در سایت NCBI انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که توالی فوق به میزان ۹۶ قرابت ژنتیکی با گونه *Rhodococcus equi* دارد. لذا این نمونه ها را *Rhodococcus sp. 501, 502* نامیده و توالی نوکلئوتیدی آنها با همین نام در سایت بانک ژنی<sup>۱</sup> با شماره دسترسی *Rhodococcus sp. 501 FN 298676* و *Rhodococcus sp. 502 FN 430570* ثبت گردید.

### بحث و نتیجه گیری


در آنزیم کلاستروول اکسیداز اولین آنزیم در مسیر تجزیه کلاستروول بوده و یک آنزیم بسیار باارزش در تشخیص کلینیکی و تعیین مقدار کلاستروول خون می باشد. به لحاظ مصرف، بعد از گلوکز اکسیداز دومین آنزیم پرمصرف است (۱۴). از کاربردهای متعدد این آنزیم می توان به تولید پیش سازهای داروهای استروئیدی در صنعت داروسازی، حذف کلاستروول از فرآورده های لبنی و آفت کشی اشاره نمود (۹۱). این آنزیم بطور طبیعی توسط منابع میکروبی مختلفی تولید و ترشح می شود، اما تولید آنزیم بوسیله میکروارگانیسمها به لحاظ کمی بسیار متغیر است و با توجه به میزان مصرف بالای آنزیم و مشکلات مربوط به خالص سازی آن از منابع میکروبی، ژن کلاستروول اکسیداز از گونه های متعدد میکروبی توسط محققین زیادی جداسازی



شکل ۳. قرمز شدن محیط کشت در اثر واکنش آنزیم کلاستروول اکسیداز باکتری *Rhodococcus sp. 501, 502* با معرف رنگزای HRP.

### تعیین هویت مولکولی باکتری

با استفاده از پرایمرهای استاندارد (1492R و 27F) آزمایش 16S rRNA-PCR انجام شد که پس از انجام روش تعیین توالی و آنالیز با کمک نرم افزار Blast موجود در سایت NCBI مشخص گردید که هر دو نمونه باکتری های گرم مثبت جدا شده از خاک، متعلق به گونه رودوکوکوس میباشند. آنها به صورت سویه های ۵۰۱ و ۵۰۲ نامگذاری شدند (شکل ۴).



شکل ۴. الکتروفورز محصول PCR (16s rRNA) باکتریهای بدست آمده با پرایمرهای استاندارد. (۱) سویه های جدا سازی شده ۵۰۱ و ۵۰۲، ۳: مارکر 1kb.

1. Gene bank (NCBI)

و کلون گردیده است (۱۵). هدف اصلی در این مطالعه، جداسازی باکتریهای بومی تولید کننده آنزیم کلسترول اکسیداز و انجام مطالعات ژنتیکی بر روی آنها بود.

در این تحقیق، بعد از غربالگری نمونه های مختلف از مناطق گوناگون کشور، موفق به جداسازی و تایید کوکوباسیل های گرم مثبت (از گونه رودوکوکوس) توسط آزمایشهای بیوشیمیایی، میکروبی و مولکولی (16srRNA) شدیم. ایهارا و همکاران نیز در سال ۱۹۸۶ توانستند سه باکتری رودوکوکوس مولد آنزیم را از خاک جدا کنند (۱۱). بطور کلی اعضای این جنس هوازی، گرم مثبت، فاقد حرکت، نوکاردیو فرم و دارای کلنی های موکوئیدی شیری رنگ نسبتاً بزرگ بر سطح محیط کشت می باشند که از لحاظ مرفولوژیکی در زیر میکروسکوپ بصورت میله ای، کوکسی یا دیپلوکوک مشاهده میگردند. باکتری رودوکوکوس توانایی تولید و ترشح آنزیم کلسترول اکسیداز را دارد که بواسطه آن میتواند کلسترول موجود در محیط را اکسید نموده و بعنوان منبع کربن مورد استفاده قرار دهد. جهت تایید توانایی فعالیت کلسترول اکسیدازی باکتریهای جدا شده از خاک، تست قرمز نمودن کاغذ صافی انجام گرفت که نتیجه آن مثبت بود. این دستاورد مبتنی بر روش بکار رفته در مطالعه ی ایزوب و همکاران بود. (۱۶)

جهت اطمینان از تولید و ترشح نوع آنزیم کلسترول اکسیداز (داخل یا خارج سلولی و یا متصل به غشا) با روشهای استاندارد ساساکی و همکاران موفق به ترشح آنزیم به دو طریق داخل و خارج سلولی شدیم که با تحقیق محققین ژاپنی، ایرانی و ایتالیایی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ همخوانی داشت (۴ و ۸ و ۹).

در مطالعات تعیین توالی باکتری (16SrRNA) مشخص گردید که سوبه مورد نظر بمیزان ۹۹٪ با رودوکوکوس اکویی مشابهت داشت. طباطبایی و همکاران نیز در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق به جداسازی این آنزیم از سوبه رودوکوکوس اکویی PTCC1633 گردیدند (۶). به همین منظور از نمونه های مختلف جمع آوری شده، کشت، غربالگری و انجام آزمایش PCR 16srRNA انجام گردید که در نهایت پس از تعیین توالی، دو باکتری رودوکوکوس به نامهای رودوکوکوس گونه ۵۰۱ و رودوکوکوس گونه ۵۰۲ جداسازی شد.

### تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله از حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و همکاری علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری قدردانی می نمایند.

## References

1. Kumari L, Kanwar S. Cholesterol Oxidase and Its Applications. *Advances in Microbiol.* 2012; 2: 49-65.
2. MacLachlan J, Wotherspoon AT, Ansell RO, Brooks CJ. Cholesterol oxidase: sources, physical properties and analytical applications. *J Steroid Biochem Mol Biol.* 2000; 72(5):169-195.
3. Navas J, Gonzalez-Zotn B, Ladron N, Garido P, Vazquez-Boland JA. Identification and mutagenesis by allelic exchange of cho E, encoding a cholesterol oxidase from the intracellular pathogen *Rhodococcus equi*. *J. Bacteriol.* 2001; 183(16): 4796-4805.
4. Yao K, Wang FQ, Zhang HC, Wei DZ. Identification and engineering of cholesterol oxidases involved in the initial step of sterols catabolism in *Mycobacterium neoaurum*. *Metab Eng.* 2013;15:75-87.
5. Pollegioni L, Piubelli L, Molla G. Cholesterol oxidase: biotechnological applications. *FEBS Journal.* 2009; 276: 6857-6870.
6. Tabatabaei-Yazdi M, Tabatabaei-Yazdi Z, Ghasemian A, Zarrini G, Olyaei NH, Sephrizadeh Z. Purification and characterization of extra-cellular cholesterol oxidase from *Rhodococcus sp.* PTCC 1633. *Biotechnol.* 2008; 7(4): 751-756.
7. Yam KC, Okamoto S, Roberts JN, Eltis LD. Adventures in *Rhodococcus* — from steroids to explosives. *J Clin Microbiol.* 2011;57:155-168.
8. Ahmad S, Roy PK, Basu SK. Cholesterol side-chain cleavage by immobilized cells of *Rhodococcus equi* DSM 89-133. *Indian J. Exp. Biol.* 1993; 31(4): 319-322.
9. Doukyu N, Characteristics and biotechnological applications of microbial cholesterol oxidases. *Appl Microbiol Biotechnol.* 2009; 83:825- 837.
10. Corbin DR, Grebenok RJ, Ohnmiess TE. Expression and chloroplast targeting of cholesterol oxidase in transgenic tobacco plants. *Plant Physiol.* 2001; 126(3): 1116-1128.
11. Aihara H, Watanabe K, Nakamura R. Characterization of production of cholesterol oxidases in three *Rhodococcus* strains. *J. Appl. Bacteriol.* 1986; 61(4): 269-274.
12. Purcell JP, Greenplate JT, Jennings MG, Ryerse JS, Pershing JC, Sims SR, Prinsen MJ, Corbin DR, Tran M, Sammons RD. Cholesterol oxidase: a potent insecticidal protein active against boll weevil larvae. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 1993;196(3): 1406-1413.
13. Abele, J. Khayam-Bashi, H. 1979. Aqueous primary standard for use in measuring cholesterol by the cholesterol oxidase method. *Clin. Chem.*, 25(1): 132-135.
14. Vrieling A, Ghisla S. Cholesterol oxidase: biochemistry and structural features. *FEBS Journal.* 2009; 276:6826-6843.
15. Fujishiro K, Uchida H, Shimokawa K, Nakano M, Sano F, Ohta T, Kayahara N, Aisaka K, Uwajima T. Purification and



properties of a new *Brevibacterium stercorarium* cholesterol oxidase produced by *E. coli* MM294/pnH10. *FEMS Microbiol. Lett.* 2002; 215(2): 243-248.

16. Isobe K, Shoji K, Nakanishi Y, Yokoe M, Wakao N. Purification and some properties of cholesterol oxidase stable in detergents from *Proteobacterium* Y-134. *J Biosci Bioeng.* 2003; 95:257-263.