

بررسی میزان آگاهی مادران زائو نسبت به مزایای شیر مادر در شهر خرم آباد

مهناز مردانی¹، اعظم محسن زاده²، مصطفی یاری پور³

1- استادیار، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2- استادیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

یافته / دوره نهم / شماره 4 / زمستان 86 / مسلسل 34

چکیده

دریافت مقاله: 86/8/2، پذیرش مقاله: 86/10/3

مقدمه: شیر مادر به تنهایی تنها منبع تغذیه مناسب در 6 ماه اول زندگی است و در صورت تغذیه مناسب و کافی مادر در دوران شیر دهی، انرژی و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و تکامل شیرخوار تأمین خواهد شد. اطلاعات و دانش ناکافی و یا باورهای غلط راجع به تغذیه شیرخوار، شاغل بودن مادران و گرایش مادران شاغل به تغذیه شیرخوار با شیر خشک و یا شروع زودتر از موعد تغذیه تکمیلی، افزایش گرایش مادران به سزارین و فاصله افتادن بین نوزاد و مادر در ساعات پلائی اولیه شیر دهی و همچنین تبلیغات فریبنده در مورد شیر خشک همگی بخشی از علل کاهش گرایش به شیر مادر و افزایش استفاده از شیر خشک است. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی مادران زائو در زمینه اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر بوده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، به منظور بررسی آگاهی مادران زائوی مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه سال 1385 در زمینه اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر کلیه زنان زائو در این فاصله زمانی مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه ای حاوی 17 سؤال بصورت تستی سه گزینه ای در اختیار مادران قرار می گرفت این سوالات در خصوص فواید و اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر و همچنین ترکیبات موجود در شیر مادر بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، کد بندی متغیرها صورت گرفت و در نرم افزار کامپیوتری وارد گردید و میزان آگاهی مادران بر حسب هر یک از متغیرها با بکارگیری تستهای آماری مناسب سنجش گردید.

یافته‌ها: از مجموع 550 نفر مادر زائوی مراجعه تعداد 33 نفر (6%) میزان آگاهی ضعیف، 216 نفر (39%) میزان آگاهی متوسط، 301 نفر (55%) میزان آگاهی بالا داشتند. همچنین بین سن مادر و میزان آگاهی آنان ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که میانگین سن مادران با میزان آگاهی ضعیف حدود 26 سال، مادران با آگاهی متوسط حدود 28 سال و مادران با آگاهی بالا حدود 31 سال بود. از طرفی مادران دارای تعداد فرزند بیشتر میزان آگاهی بیشتری داشتند. بین سطح سواد مادران و میزان آگاهی آنها ارتباط معنی داری وجود داشت به طوری که با افزایش میزان تحصیلات میزان آگاهی مادران در مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر افزایش می یافت. در بین مادران شاغل میزان آگاهی بالاتر از مادران خانه دار بود و از نظر محل سکونت نیز مادران ساکن شهر میزان آگاهی بالاتری نسبت به مادران ساکن روستا داشتند. در این پژوهش همچنین مشخص گردید که بین سطح درآمد خانواده و میزان آگاهی مادران ارتباط معنی داری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه مذکور، میزان آگاهی مادران تقریباً خوب می باشد ولی هنوز تعداد زیادی از مادران از آگاهیهای لازم در مورد تغذیه شیرخواران برخوردار نیستند. به ویژه مادران جوان و مادران ساکن روستا. لذا لزوم توجه بیشتر به این گروه از مادران ارائه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه شیر مادر معطوف می شود.

کلید واژه‌ها: آگاهی، مادران زائو، تغذیه شیرخوار، تغذیه انحصاری، بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد

آدرس مکاتبه: خرم آباد، کمالوند، مجتمع آموزشی پردیس، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پزشکی

پست الکترونیک: ms.mardani@yagoo.com

مقدمه

مزایای مختلف شیر مادر هم برای شیر خوار و هم برای مادر کاملاً ثابت شده است (1). در شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می‌شوند میزان بروز و شدت بیماری‌های عفونی ناشی از باکتری و ویروس و انگل شامل اسهال، پنومونی، مننژیت، عفونت گوش میانی و انسفالیت و بیماری‌های حساسیتی نظیر آسم، اگزما و تب یونجه و نیز سرطان و بیماری‌های مزمن در سالهای بعدی زندگی بسیار کمتر می‌باشد. و به همین علت میزان بستری شدن آنها در بیمارستان و شانس سوء تغذیه و ناتوانی و معلولیت و مرگ و میر آنها نیز کمتر می‌باشد. همچنین شیردهی و تغذیه با شیر مادر فواید بسیاری برای مادر از جمله کاهش خطر بروز سرطان، پوکی استخوان، آسم فقر آهن و بارداری ناخواسته و ... داشته و فواید بسیاری برای خانواده هم از نظر اقتصادی و هم از نظر روانی دارد. به علاوه برای کشور و جامعه نیز حائز اهمیت می‌باشد (2).

از سوی دیگر بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت از 130 میلیون نوزادی که سالانه در کل جهان به دنیا می‌آیند حدود 20 میلیون نفر در 4 هفته اولیه عمر خود می‌میرند (3). همچنین در اکثر کشورهای جهان سوم بیشترین آمار مرگ و میر این کودکان به دلیل سوء تغذیه، عفونتهای تنفسی و بیماری‌های اسهالی اتفاق می‌افتد (4).

از طرفی بیشترین میزان کاهش در شیر مادر دهی در 4 هفته اول زندگی اتفاق می‌افتد که این امر از نظر مادران به دلایلی از قبیل کمبود شیر، مشکلات مادر در خصوص تکنیک درست شیر دهی و یا کم اطلاعی مادران از مزایای شیر مادر می‌باشد (5و6). به همین دلیل اجرای برنامه بیمارستانهای دوستدار کودک از طرف یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در راستای آموزش پرسنل واحدهای بهداشتی و درمانی در زمینه شیر مادر و روشهای صحیح شیر دهی بوده است تا از این طریق کلیه مادران در محیط های بهداشتی درمانی آموزشهای لازم در زمینه مزایای شیر مادر و روشهای درست

شیر دهی کسب نموده و قادر باشند شیر دهی موفقیت آمیزی داشته باشند (7). از آنجائیکه مطالعات مختلف حاکی از آن است که آگاهی های والدین نسبت به شیر مادر نقشی بسیار موثر تر و قویتری نسبت به فاکتورهای مختلف اقتصادی - اجتماعی خانوار بر روی شیر مادر دهی دارد (8) و از سوی دیگر در شهر خرم آباد مطالعه ای بر روی میزان آگاهی مادران زائو نسبت به شیر مادر و مزایای آن انجام نشده بود بر آن شدیم این تحقیق را انجام دهیم.

مواد و روشها

در این مطالعه مقطعی، به منظور بررسی میزان آگاهی مادران در زمینه اهمیت و مزایای تغذیه با شیر مادر، کلیه زنان زائوی مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 در نظر مورد بررسی و پرسشگری قرار گرفتند.

روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه از قبل طراحی شده ای بود که در قالب آن پرسشنامه تعداد 17 سؤال بصورت تستی سه گزینه ای در اختیار مادران قرار می گرفت این تعداد سؤال بر اساس منابع علمی تغذیه ای طوری طراحی شده بود که فواید و اهمیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر و ترکیبات موجود در شیر مادر را در بر می گرفت. از این تعداد سؤالات، به سه سوال بدلیل اهمیت فراوان 2 نمره تعلق گرفته و بقیه سؤالات یک نمره ای بودند و در مجموع نمرات این پرسشنامه 20 نمره بود.

به هر پاسخ درست یک نمره (و در سوالات دو نمره ای 2 نمره) تعلق می گرفت. و به هر پاسخ نادرست یا عدم پاسخ، نمره صفر تعلق می گرفت و لذا نمره آگاهی مادران از 0 - 20 متغیر بود. مادرانی که نمره 10 و زیر 10 اخذ می کردند در گروه مادران بامیزان اطلاعات ضعیف، مادرانی که نمره 15 - 11 اخذ می کردند، در گروه مادران با میزان آگاهی متوسط و مادرانی که نمره 16 و بالاتر اخذ می کردند مادران با میزان آگاهی بالاتر می شدند. پس از تکمیل پرسشنامه ها، کد

مورد بررسی، تعداد 33 نفر (6%) میزان آگاهی ضعیف، 216 نفر (39%) میزان آگاهی متوسط و 301 نفر (55%) میزان آگاهی بالا دارا بودند نفر (55%) از سطح آگاهی خوبی برخوردار بودند.

جدول شماره 2 نشان دهنده میزان آگاهی مادران بر حسب گروه سنی آنان است، در این پژوهش و بر اساس نتایج جدول شماره 2 و 3 و انجام آنالیز واریانس، بین سن مادران و میزان آگاهی آنان ارتباط معنی داری وجود داشت و همچنین میانگین سن مادران با میزان آگاهی ضعیف حدود 26 سال، مادران با آگاهی متوسط حدود 28 سال و مادران با آگاهی بالا حدود 31 سال بود.

علاوه بر آن در این پژوهش با استفاده از آزمون کروسکال والیس و در سطح خطای 5%، ارتباط معنی دار آماری بین تعداد فرزندان و میزان آگاهی مادران وجود داشت و مادران اول زا کمترین میزان آگاهی را داشته حال نکه مادران با 1 یا 2 فرزند قبلی از آگاهی بالاتری برخوردار بودند (جدول شماره 4)

جدول شماره 1- فراوانی مطلق و نسبی مادران زائوی مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385

سطح آگاهی	فراوانی	فراوانی مطلق (نفر)	فراوانی نسبی (%)
ضعیف	33	6	
متوسط	216	39	
خوب (بالا)	301	55	
جمع کل	550	100	

بندی متغیرها صورت گرفته و در برنامه نرم افزاری کامپیوتری وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

پس از جمع آوری اطلاعات و وارد کردن آنها در برنامه نرم افزار، نتایج در قالب جداول آماری و نمودارهای مناسب تهیه گردید و در جاهایی که نیاز به ارتباط سنجی آماری بود از آزمون کای اسکوار، آنالیز واریانس، کروسکال والیس استفاده می شود.

با توجه به اینکه به مادران واجد شرایط توضیح لازم در خصوص انجام طرح و پرسشگری داده می شد و نمونه خاصی از مادران گرفته نمی شد، و مادران بنا به تمایل خود پرسشنامه های مذکور را تکمیل می کردند، همچنین پرسشنامه ها فاقد مشخصات فردی مادران مورد نظر بود لذا در انجام مطالعه فوق مشکل اخلاقی خاصی وجود نداشت.

یافته ها

در این مطالعه کلیه زنان زائوی مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان خرم آباد در آذر ماه سال 1385 که 550 نفر بودند جهت تعیین میزان آگاهی آنان نسبت به مزایای شیر مادر مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین رابطه بین سطح آگاهی مادران با متغیرهای سن مادر در هنگام زایمان، سطح درآمد خانواده، تعداد فرزندان، سطح سواد مادر، شغل مادر و محل سکونت مادر (شهر یا روستا) بررسی گردید. در این پژوهش بر اساس جدول شماره 1 از کل 550 زن

جدول شماره 2- فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 بر حسب گروههای

میزان آگاهی	سن		سنی آنها						
	تعداد	درصد	19-23	24-28	29-33	34-38	بالاتر از 38 سال	مجموع	
ضعیف	10	30/3	13	39/4	9	27/3	3	33	100
متوسط	42	19/4	73	33/8	64	29/6	31	216	100
بالا	2	0/7	65	21/6	136	452/2	88	301	100
مجموع	54	9/8	151	27/8	209	38	120	550	100

p<0/0001

جدول شماره 3: میانگین و انحراف معیار سن مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 بر حسب میزان آگاهی آنها

میزان آگاهی مادران	تعداد	میانگین سن	انحراف معیار
ضعیف	33	26/2424	4/1535
متوسط	216	28/4213	4/9097
بالا	301	31/5482	3/8395
مجموع	550	30/0018	4/6524

جدول شماره 4- فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 بر حسب تعداد فرزندان آنها

میزان آگاهی	تعداد فرزند		0		1		2		3		4		5		6		مجموع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ضعیف	19	57/6	9	27/3	3	9/1	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	33	100
متوسط	76	35/2	53	24/5	45	20/8	25	11/6	11	5/1	5	2/3	1	5	5	216	100	
بالا	50	16/6	68	22/6	96	31/9	62	20/6	16	5/3	6	2	3	2	301	100		
مجموع	145	26/4	130	23/6	144	26/2	88	16	28	5/1	11	2	4	7	550	100		

p<0/0001

دو در مادران شاغل میزان آگاهی نسبت به مادران خانه دار بطور معنی داری بیشتر بود. طبق نتایج مندرج در جدول شماره 7 در این بررسی بین محل سکونت مادر و سطح آگاهی های وی در ارتباط با شیر مادر ارتباط معنی دار بود و در مناطق شهری بیشترین میزان مادران از سطح آگاهی های بالا برخوردار بودند، حال آنکه در مناطق روستائی نه تنها درصد مادران با سطح آگاهی کم، بیشتر از مادران شهری بودند بلکه درصد بالائی از این مادران از سطح آگاهی متوسطی برخوردار بودند. در این بررسی بین درآمد ماهیانه خانوار و سطح آگاهی های مادران رابطه آماری معنی داری مشاهده نگردید

همچنین برطبق جدول شماره 5، در بررسی حاضر و با استفاده از آزمون کروسکال والیس در سطح خطای 5% ارتباط معنی داری بین میزان آگاهی و سطح سواد مادران وجود داشت بطوریکه در مادران بیسواد و دارای مدرک تحصیلی سیکل کمترین میزان آگاهی وجود داشت حال آنکه مادران با مدرک تحصیلی دانشگاهی نه تنها سطح آگاهی پایین نداشتند بلکه از سطح آگاهی بالائی برخوردار بودند.

جدول شماره 6 بیانگر رابطه معنی دار بین وضعیت اشتغال مادران و میزان آگاهی های آنان نسبت به شیر مادر بود. بر اساس نتایج این جدول و با استفاده از تست آماری کای

جدول شماره 5: فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 بر حسب سطح سواد آنها

میزان آگاهی	تعداد فرزند		بی سواد		سیکل		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس و بالاتر		مجموع	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
ضعیف	9	27/3	17	51/5	7	21/2	0	0	0	0	0	0	33	100
متوسط	37	17/1	79	36/6	87	40/3	11	5/1	2	0/9	2	5/1	216	100
بالا	10	3/3	29	9/6	132	43/9	79	26/2	51	16/9	51	26/2	301	100
مجموع	56	10/2	125	22/7	226	41/1	90	16/4	53	9/6	53	16/4	550	100

p<0/001

جدول شماره 7: فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 بر حسب

محل سکونت آنها

محل سکونت	شهر		روستا		مجموع
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
ضعیف	21	4/2	12	25/5	33
متوسط	183	36/4	33	70/2	216
بالا	299	59/4	2	4/3	301
مجموع	503	100	47	100	550

p<0/0001

بالائی از آگاهی های مادران نسبت به شیرمادر دهی در زنان سریلانکائی مراجعه کننده به بیمارستان گزارش نمودند(12)، از طرفی مطالعه دونگی و همگارانیش بر روی زنان گلاسکو نشان داد که اینگونه نادران آگاهی ضعیفی برخوردار هستند.(13) در بررسی سوانسون و همکارانش(14) بر روی دختران و پسران دبیرستانی اسکاتلند نیز سطح آگاهی افراد مورد بررسی در خصوص شیر مادر، اندک گزارش گردید. این نتایج حاکی از آن است که میزان آگاهی های مادران در مناطق مختلف متفاوت بوده و می تواند ارتباط تنگاتنگی با وجود بیمارستانهای دوستدار کودک و آموزشهای مناسب به مادران از طریق مراکز بهداشتی درمانی و یا رسانه های گروهی و غیره دارد.

از طرفی در این مطالعه بین سن مادران و میزان آگاهی های آنان ارتباط آماری معنی داری وجود داشت و نشان می داد که مادران جوانتر نسبت به مادرانی که سنشان بیشتر است از سطح آگاهی کمتری برخوردارند و این امر می تواند به دلیل اول زا بودن اینگونه مادران جوان و عدم تجربه شیردهی قبلی و در نتیجه مراجعه کمتر به واحد های ارائه خدمات باشد. هر چند در بررسی انجام شده توسط خیری در قزوین(9) و کریمی در یزد(4) علیرغم کمتر بودن آگاهی مادران جوانتر نسبت به مادران بالای 25 سال اما این ارتباط معنی دار نبود.

علاوه بر این در مطالعه حاضر بین میزان آگاهی مادر و سطح تحصیلات آنان ارتباط معنی دار وجود داشت ، بطوریکه

جدول شماره 6: فراوانی میزان آگاهی مادران زائو مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی خرم آباد در آذر ماه 1385 بر حسب

شغل آنها

میزان آگاهی	شغل مادر		خانه دار		مجموع
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
ضعیف	31	8/5	2	1/1	33
متوسط	172	47/4	44	23/5	216
بالا	160	44/1	141	75/4	301
مجموع	363	100	187	100	550

p<0/001

بحث

این مطالعه بصورت مقطعی و به منظور بررسی میزان آگاهی مادران زائوی مراجعه کننده به بیمارستان حاج کریم عسلی در تاریخ آذر ماه 1385 در زمینه اهمیت تغذیه با شیر مادر انجام گرفت و علاوه بر آن ارتباط بین میزان آگاهی مادران با سایر متغیرها از قبیل سن مادر، تعداد فرزندان قبلی مادر، وضعیت اشتغال مادر، میزان درآمد ماهیانه خانوار، سطح تحصیلات مادر و محل سکونت خانوار نیز در این مطالعه بررسی گردید. در این مطالعه 55% مادران از آگاهی های بالائی در ارتباط با مزایای شیر مادر برخوردار بودند 39% آگاهی متوسط و تنها 6% از آنان آگاهی ضعیفی داشتند. در مطالعه مشابهی که جهت تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کوثر قزوین در مورد مزایای تغذیه با شیر مادر انجام شده 52/7 درصد جامعه مورد پژوهش دارای آگاهی زیاد ، 41/7 درصد دارای آگاهی متوسط و تنها 5/7 درصد دارای آگاهی کم بودند(9).

در مطالعه انجام شده بر روی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر لاهیجان اکثر مادران مورد مطالعه از آگاهی کمی در خصوص مزایای شیر مادر داشتند(10). در بررسی انجام شده توسط السا و همکارانش بر روی مادران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان میزان آگاهی های مادران را ضعیف اعلام نمود(11). اوپال سنارات و همکاران نیز سطح

دریافت نموده اند و با از طریق رسانه های گروهی و یا اطرافیان کسب اطلاع نموده اند.

نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رابطه معنی دار بین وضعیت اشتغال مادران و میزان آگاهی های آنان نسبت به شیر مادر بود، بطوریکه بیشترین درصد از مادران شاغل (75/4%) میزان آگاهی بالایی داشته حال آنکه در مادران خانه دار بیشترین درصد مادران از آگاهی متوسط (47/4%) برخوردار بودند. علت این یافته می تواند این مسأله باشد که اولاً معمولاً مادران شاغل تحصیلات بالاتری نسبت به مادران خانه دار دارند ثانیاً مادران شاغل به لحاظ روابط اجتماعی گسترده تر (در محیط شغلی) تجربیات بیشتری کسب می نمایند. نتایج بررسی لاهیجان (10) و بررسی آزادشهر یزد (4) مشابه نتایج حاضر می باشد همچنین مطالعه بر روی زنان سریلانکایی (12 و 17) نشان داد صرف نظر از سطح سواد مادران، مادران شاغل میزان آگاهی بیشتری نسبت به زنان خانه دار دارند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است که این نکته را به دلیل روابط اجتماعی بیشتر و در نتیجه کسب اطلاعات بیشتر از طریق اطرافیان در محیط کاری ذکر نموده اند.

در بررسی حاضر، میان سطح آگاهی مادران ساکن شهر و روستا اختلاف معنی دار آماری وجود داشت و نتایج حاکی از آن بود که اکثریت مادران ساکن شهر میزان آگاهی بالا و سپس آگاهی متوسط داشته حال آنکه اکثریت مادران ساکن روستا میزان آگاهی متوسط و سپس آگاهی کم داشتند. علت این یافته احتمالاً نتیجه بالاتر بودن سطح سواد مادران شهری و در نتیجه کسب اطلاعات لازم چه در محیطهای درسی و چه از اطرافیان بوده و یا به دلیل دسترسی آسانتر مادران شهری به آموزشهای موثر از طریق رسانه های گروهی و یا کتب و مجلات علمی است. در مطالعه مشابهی که جهت تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کوثر قزوین انجام شده نتایج نشان می دهد که میانگین نمره آگاهی در زنان شهری بالاتر از زنان روستایی می باشد (9).

مادران بیسواد و دارای مدرک تحصیلی سیکل کمترین میزان آگاهی، حال آنکه مادران با مدرک تحصیلی دانشگاهی بیشترین سطح آگاهی را داشتند. در مطالعه انجام شده در قزوین (9) بررسی انجام شده در کرمان (15) مطالعه مصفا خمایی در لاهیجان (10) مطالعه یزد (4) و مطالعه انجام شده در ایرلند شمالی (16) نیز نتایج مشابهی بدست آمده است. در مطالعه انجام شده در سریلانکا (12) هرچند با افزایش سطح سواد مادران میزان آگاهی آنان بیشتر می شد ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود. بدیهی است هر چه سطح سواد مادر بالاتر باشد امکان دسترسی وی به منابع علمی از قبیل کتب و مجلات علمی بیشتر خواهد شد و همچنین در بسیاری از کشورها در دانشگاهها برنامه آموزشی مناسب در خصوص شیر مادر دهی و تغذیه مناسب شیر خواران ارائه می گردد. و این امر می تواند اثرات مثبت و موثری بر میزان آگاهی مادران داشته باشد.

نتایج بررسی حاضر موید آن است که بین تعداد فرزندان و میزان آگاهی مادران ارتباط معنی دار وجود دارد و مادران اول زا کمترین میزان آگاهی را داشته حال آنکه مادران با 1 یا 2 فرزند قبلی از آگاهی بالاتری برخوردارند. دو مطالعه انجام شده در سریلانکا (17 و 12) نتایج مشابهی گزارش نمودند. البته مطالعه انجام شده در لاهیجان و همچنین مطالعه آزادشهر یزد (4 و 10) رابطه معنی دار آماری بین سطح آگاهی مادران و تعداد فرزندان قبلی نشان ندادند.

یافته ما می تواند به این دلیل باشد که مادرانی که فاقد فرزند می باشند معمولاً جوانتر بوده واکثراً تحصیلات دانشگاهی نداشته و همچنین تجربیات کمتری راجع به روشهای درست تغذیه با شیر مادر دارند و از سویی مادرانی که حداقل یک زایمان قبلی داشته اند اکثراً دفعات بیشتری به خانه ها و مراکز بهداشتی (به منظور پایش رشد یا واکسیناسیون) مراجعه کرده اند و از طریق این مراکز اطلاعات و آموزش های بیشتری

شهری و روستایی، هم از طریق بیمارستانها و هم از طریق رسانه های گروهی مانند صدا و سیما صورت گیرد.

مهمترین محدودیت و مشکلی که در انجام این طرح تحقیقاتی وجود داشت عدم همکاری برخی از مادران زائو به علت عدم تمایل به پاسخ گوئی و یا درد شدید زایمان بود که البته خوشبختانه در مجموع تعداد این موارد بسیار اندک بود.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از کلیه مادران که صمیمانه با پاسخ به پرسشنامه ما را یاری نمودند و همچنین از کلیه پرسنل زحمتکش و کوشای بیمارستان عسلیمان خرم آباد به خاطر همکاریهای بی دریغ خود در امر تحقق این تحقیق اعلام می دارند.

در مطالعه ما ارتباط معنی دار آماری بین میزان آگاهی مادران و درآمد خانوار مشاهده نگردید. نتایج بررسی لاهیجان (10) نیز مشابه تحقیق ما می باشد.

نتیجه گیری

در این بررسی مادران از میزان آگاهی نسبتا قابل قبولی در رابطه با مزایای شیر مادر و چگونگی تغذیه با شیر مادر برخوردار بودند و با توجه به نتایج این تحقیق و تاثیر معنی دار سطح سواد، گروه سنی، تعداد فرزندان قبلی و محل سکونت مادران بر روی میزان آگاهی های آنان در خصوص تغذیه مناسب نوزادان و اهمیت و ضرورت تغذیه با شیر مادر بخصوص برای مادران جوان و اول زاء، توصیه می گردد آموزش های مناسب تغذیه ای، بویژه در ارتباط با مزایای متعدد شیر مادر بصورت گسترده و منظم هم از طریق مراکز بهداشتی درمانی

References

- 1-Rose VA, Warrington VO, Linder R, Williams CS, Factors influencing infant feeding method in an urban community. J Natl Med Assoc. 2004; 96(3):325-31.
- 2- اصفهانی، م م، آسائی، محمد، دانستنی های تغذیه شیرخواران، تهران: انتشارات انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر جمهوری اسلامی ایران، چاپ 1377، فصول 6 - 2، صص 77 - 44 و فصل 10 صص 140 - 137.
- 3- Lawn, J., Cousens, S., Zupan, J. million neonatal deaths: When? Where? Why? Lancet, 2005; 365 (4): 891-900
- 4- کریمی، م. اردوئی، م. و جمشیدی، خ: میزان آگاهی مادران از تغذیه اطفال در 2 سال اول بعد از تولد در منطقه آزادشهر یزد: مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد. سال نهم، زمیمه شماره چهارم. زمستان 1380. صص 16.
- 5- Labarere J, Gelbert-Baudino N, Ayral AS, Duc C, Berchotteau M, Bouchon N, Schelstraete C, Vittoz JP, Francois P, Pons JC. Efficacy of breastfeeding support provided by trained clinicians during an early, routine, preventive visit: a prospective, randomized, open trial of 226 mother-infant pairs. Pediatrics. 2005;115(2):139-46.
- 6- Law SM, Dunn OM, Wallace LM, Inch SA. Breastfeeding Best Start study: training midwives in a 'hands off' positioning and attachment intervention. Matern Child Nutr. 2007; 3(3):194-205.
- 7- Owoaje ET, Oyemade A, Kolude OO. Previous BFHI training and nurses' knowledge, attitudes and practices regarding exclusive breastfeeding. Afr J Med Med Sci. 2002; 31(2):137-40.
- 8- Scott JA, Shaker I, Reid M. Parental attitudes toward breastfeeding: their association with feeding outcome at hospital discharge. Birth. 2004; 31(2):125-31.
- 9- خیری، ز. و همکاران: تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی کوثر قزوین در مورد مزایای تغذیه با شیر مادر، اسفند 1380 و فروردین ماه 1381، پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
- 10- مصفای خمایی: بررسی آگاهی و نگرش مادران در طی یکسال اول بعد از زایمان نسبت به تغذیه با شیر مادر، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ سال سیزدهم شماره 51، پاییز 1383.
11. Elsa R. J. Giugliani, Vera Lúcia L. Rocha, Jaqueline M. Neves, Carisi A. Polanczyk, Cristina F. Seffrin, Lulie O. Susin, Conhecimentos maternos em amamentação e fatores associados Maternal knowledge on breastfeeding and related factors. J. pediatr. 1995; 71(2):77-81.
- 12- Upul Senaratha B, Dulitha N. Fernandoa, Graham Vimpanib, Ishani, Factors associated with maternal knowledge of newborn care among hospital-delivered mothers in Sri Lanka. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2007; 101: 823-830
- 13- Dungy CI, McInnes RJ, Tappin DM, Wallis AB, Oprescu F: Infant Feeding Attitudes and Knowledge among Socioeconomically Disadvantaged Women in Glasgow. Matern Child Health J. 2007; [Epub ahead of print].
- 14-Swanson V, Power KGJ: Initiation and continuation of breastfeeding: theory of

- planned behaviour.): Adv Nurs, 2005; 50(3):272-82.
- 15- ترابی پاریزی ، ن ، بررسی نگرش مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در رابطه با تغذیه شیرخواران در شهر کرمان 82 - 1381 ، پایان نامه دکترا ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان .
- 16- Sittlington J, Stewart-Knox B, Wright M, Bradbury I, Scott JA: Infant-feeding attitudes of expectant mothers in Northern Ireland. Health Educ Res. 2007; 22(4):561-70.
- 17 - Senarath U, Fernando DN, Vimpani G, Rodrigo I: Factors associated with maternal knowledge of newborn care among hospital-delivered mothers in Sri Lanka. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2007; 101(8):823-30. Epub 2007 May 2.