

ارتباط بین فریتین سرم با سندروم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم آباد

ابراهیم فلاحی^{*}، فرزاد ابراهیم زاده^۲، انیس میرزازاده^۳، عاطفه فلاح^۳

- ۱- استاد، مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
- ۲- مری، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
- ۳- دانشجو، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.

یافته / دوره شانزدهم / شماره ۳ / پاییز ۹۴ / مسلسل ۶۱

چکیده

دریافت مقاله: ۹۴/۸/۱۰ پذیرش مقاله: ۹۴/۸/۱۸

- * مقدمه: شیوع سندروم متابولیک در حال افزایش است و شناسایی عوامل مرتبط با آن در بحث پیشگیری اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط فریتین سرم و سندروم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم آباد است.
- * مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی مورد شاهدی تعداد ۲۰۱ فرد غیر مبتلا به سندروم متابولیک (گروه شاهد) و ۱۷۷ فرد مبتلا به سندروم متابولیک (گروه مورد) مورد بررسی قرار گرفت. فریتین سرم با روش رادیوایمونوآسی اندازه گیری شد. سندروم متابولیک بر اساس معیارهای ارائه شده از طرف برنامه ملی آموزش کلسترونول پانل ۳ درمان بزرگسالان تعریف شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای کوواریانس، کای اسکور و تی مستقل استفاده شد.
- * یافته‌ها: از ۳۷۸ نفر شرکت کننده در مطالعه ۷۴/۹٪ زن و ۷۱/۲٪ متأهل بودند. ۵۲/۶٪ تحصیلات دیپلم یا کمتر داشتند. مهمترین شاخص‌هایی که با سندروم متابولیک ارتباط معنی داری داشتند. سن ($P=0.001$)، وضعیت تأهل ($P=0.001$)، میزان تحصیلات ($P=0.006$) و فریتین سرم ($P=0.001$) بودند. بین متغیرهای میزان درآمد، جنس، وضعیت مصرف سیگار با سندروم متابولیک ارتباط معنی داری دیده نشد.
- * بحث و نتیجه‌گیری: شیوع سندروم متابولیک در افرادی که سطح فریتین سرم بالایی داشتند نسبت به افراد با سطح فریتین پایین و طبیعی بیشتر بود. نتیجه گیری کلی اینکه ارتباط مستقیمی بین سطح فریتین و شیوع سندروم متابولیک وجود دارد.
- * واژه‌های کلیدی: سندروم متابولیک، فریتین سرم، بزرگسالان، خرم آباد.

*آدرس مکاتبه نویسنده مسئول: خرم آباد، گلددشت شرقی، دانشکده بهداشت و تغذیه، گروه تغذیه.

پست الکترونیک: falahi.e@lums.ac.ir

مقدمه

سندروم متابولیک در ایران شیوع این سندروم طبق NCEP-ATPIII برابر ۳۴/۷٪ تخمین زده شد که بهوضوح بالاتر از میانگین ذکر شده در کشور آمریکا است (۶). در مطالعه قند و لیپید تهران شیوع سندروم متابولیک در مردان ۲۴٪ و در زنان ۴۲٪ تخمین زده شد (۴).

مطالعات نشان داده است که سطح فریتین با سندروم متابولیک در ارتباط است (۷). فریتین پروتئین ذخیره‌ای است و آهن را که بصورت طبیعی در کبد (سیستم رتیکولواندوتیال) طحال و مغز استخوان وجود دارد از سایر قسمت‌ها مجزا می‌کند. هر چه میزان آهن افزایش یابد سطح داخل سلولی فریتین نیز افزایش یافته تا ذخایر آهن را تأمین کند. مقدار کمی از فریتین به خون راه می‌یابد بنابراین اندازه گیری فریتین که به سرم نشست کرده یک شاخص بسیار خوب برای ارزیابی اندازه ذخایر آهن بدن می‌باشد (۸). طبق مطالعات مختلف افزایش فریتین در ارتباط با سندروم متابولیک است و افراد با سطح فریتین بالاتر خطر ابتلا به سندروم متابولیک در آنها بیشتر است (۴).

با توجه به اینکه فریتین سرم می‌تواند ابزار مناسبی برای پیش‌بینی و ارزیابی بیماران مبتلا به سندروم متابولیک باشد (۹). لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط فریتین سرم و سندروم متابولیک انجام شد.

مواد و روش‌ها

این بررسی یک مطالعه مقطعی است که نمونه‌های آن از بین ۹۷۳ نفر از افراد بالای ۱۸ سال شهر خرم آباد که در طرح بررسی ارتباط الگوهای غذایی با سندروم متابولیک شرکت کرده بودند انتخاب شدند.

اندازه گیری دور شکم

دور شکم در باریکترين ناحیه کمر در حالتی ارزیابی گردید که فرد در انتهای بازدم طبیعی خود قرار داشت. اندازه

سندروم متابولیک یکی از مهمترین مشکل بهداشتی در قرن حاضر است که روند رو به رشدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارند. شرایط پیش التهابی به ایجاد این سندروم کمک می‌کند (۱،۲). طبق معیارهای ارائه شده از طرف برنامه ملی آموزش کلسترول پانل ۳ درمان بزرگسالان حضور حداقل ۳ معیار از معیارهای زیر برای تشخیص سندروم متابولیک لازم است:

- ۱- چاقی شکمی: دور کمر بالای ۱۰۲ سانتی متر در مردان و بالاتر از ۸۸ سانتی متر برای زنان
- ۲- سطح بالای تری گلیسرید خون: بیشتر یا مساوی ۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر
- ۳- HDL کلسترول پایین: کمتر یا مساوی ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر در مردان و کمتر یا مساوی ۵۰ میلی گرم در دسی لیتر در زنان
- ۴- فشار خون بالا: بیشتر یا مساوی ۱۳۰/۸۵ میلی متر جیوه
- ۵- گلوکز ناشتاپ بالا: بیشتر یا مساوی ۱۱۰ میلی گرم در دسی لیتر (۳).

افزایش خطر دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی و عروقی در اثر سندروم متابولیک قابل توجه می‌باشد (۱). طبق تعریف ATPIII اجزای سندروم متابولیک با بیماری‌های قلبی و عروقی (CVD) مرتبط می‌باشند (۳). اگر چه اتیولوژی سندروم متابولیک هنوز شناخته نشده است ولی به نظر می‌رسد مجموعه ای از عوامل ژنتیکی، متابولیکی و محیطی از جمله رژیم غذایی در بروز این سندروم نقش داشته باشند (۴). شیوع سندروم متابولیک با توجه به تعاریف گوناگونی که برای آن ارائه شده در نژادهای مختلف متفاوت ذکر شده است. طبق معیارهای NCEP-ATPIII حدود ۲۵٪ از جمعیت آمریکا (معادل ۵۰ میلیون نفر) و ۱۰٪ از جمعیت فرانسه به این سندروم مبتلا هستند (۵). در اولین مطالعه ملی بررسی شیوع

ارزیابی فریتین سرم

نمونه های سرم در فریزر ۷۰- درجه سانتیگراد در مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نگهداری شدند. سپس نمونه سرم ۱۷۷ نفر از افراد مبتلا به سندروم متابولیک و ۲۰۱ فرد سالم برای اندازه گیری فریتین مورد ارزیابی قرار گرفت.

با توجه به اینکه نمونه های سرم موجود در آزمایشگاه دارای کدها یا شناسه های مخصوص بودند لذا از روش نمونه گیری سیستماتیک برای نمونه های خون استفاده شد. برای بدست آمدن تعداد نزدیک به هم از دو گروه با توجه به اینکه تعداد افراد مبتلا به سندروم متابولیک کمتر از افراد سالم بود، از هر ۳ شماره متوالی ۲ شماره از افراد مبتلا و در افراد سالم از هر ۳ شماره متوالی یک شماره به تصادف انتخاب شد. متغیر مستقل اصلی در این مطالعه ابتلا به سندروم متابولیک بود که افراد در دو گروه مبتلا به سندروم و غیر مبتلا به سندروم دسته بنده شدند. گروه شاهد افرادی بودند که مبتلا به سندروم متابولیک نبوده و گروه کنترل افراد مبتلا به سندروم متابولیک بودند که با نسبت ۱ به ۱ در مطالعه نمونه گیری شدند.

معیارهای خروج از مطالعه نیز عبارتند از :

- ۱- مصرف مکمل آهن و هر گونه دارو یا مواد معدنی و ویتامین
- ۲- داشتن رژیم غذایی خاص
- ۳- داشتن دوره پریود
- ۴- دریافت انرژی کمتر از ۸۰۰ یا بیشتر از ۴۰۰۰ کیلوکالری در روز.

درنهایت نمونه های سرم افراد برای اندازه گیری فریتین سرم به آزمایشگاه ارجاع داده شدند. فریتین با روش رادیو ایمونوآسی و با دستگاه گاماکانتر اندازه گیری شد.

آنالیز آماری

داده ها در نرم افزار SPSS ویرایش ۱۹ وارد شدند و برای تعديل متغیرهای مخدوش کننده از روش آنالیز

گیری دور شکم با استفاده از یک متر نواری غیر قابل ارجاع و بدون تحمیل هرگونه فشاری به بدن فرد با دقیقه ۱/۰ سانتی متر صورت گرفت.

ارزیابی های بیوشیمیایی

نمونه خون سیاهرگی پس از ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا بودن، جهت اندازه گیری سطح گلوكز خون و لیپیدهای سرم (شامل -HDL-کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL-کلسترول و -کلسترول آوری گردید. قندخون در همان روز نمونه گیری به روش فتومتریک و با استفاده از گلوكز اکسیداز (با بکارگیری کیت تجاری شرکت پارس آزمون) اندازه گیری شد. سطوح سرمی کلسترول تام، تری گلیسرید، -HDL-کلسترول و LDL-کلسترول نیز با استفاده از کیت های تجاری شرکت پارس آزمون اندازه گیری شد.

ارزیابی فشارخون

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در دو نوبت و به فاصله حداقل ۱۵ دقیقه، توسط یک فرد آموزش دیده با استفاده از فشارسنج جیوهای در حالت نشسته از بازوی دست راست اندازه گیری و میانگین آنها محاسبه و ثبت شد. فشارخون سیستولیک با شنیده شدن اولین صدای کورتکوف و فشارخون دیاستولیک با از بین رفتن صدای (فاز ۵ کورتکوف) ثبت گردید. پیش از اندازه گیری فشارخون، از افراد در مورد مصرف سیگار، چای، قهوه، فعالیت فیزیکی و پر بودن مثانه سوال شد.

تعریف سندروم متابولیک

براساس معیار (NCEP-ATPIII) افرادی که حداقل سه معیار از معیارهای تعریف شده را دارا بودند مبتلا به سندروم متابولیک شناخته شدند (۳).

افراد بی سواد ۱۸/۱٪، افراد با میزان تحصیلات دیپلم یا کمتر ۵۹/۳٪ و افراد با تحصیلات دانشگاهی ۲۲/۶٪ مبتلایان به سندروم متابولیک را شامل می شوند. بر اساس نتایج آزمون مجدور کای بین دو عامل فوق ارتباط معنی داری وجود دارد ($P < 0.001$). ارتباط بین سندروم متابولیک با سایر عوامل در جدول ۱ معنی دار نبود.

جدول ۲ وضعیت افراد مبتلا به سندروم متابولیک و افراد سالم را بر اساس میزان فریتین نشان می دهد.

نتایج آزمون مجدور کای نشان داد که بین دو عامل فریتین سرم و ابتلا به سندروم متابولیک ارتباط معنی داری وجود دارد ($P = 0.006$).

به طوری که شیوع سندروم متابولیک در افرادی که سطح فریتین پایین و بالایی داشتند نسبت به افرادی که سطح فریتین آنها طبیعی بوده است، بیشتر بود. در کل می توان گفت بالاترین شیوع سندروم متابولیک در افرادی بوده است که دارای سطح فریتین بالای بوده اند.

خطر ابتلا به سندروم متابولیک با سطح پایین فریتین نسبت به سطح بالای فریتین ارتباط معنی داری نداشت ($P = 0.101$) و ($OR = 0.250$) با این وجود خطر مذکور در افراد با سطح پایین فریتین نسبت به افراد دارای سطح بالای فریتین کمتر بود.

سطح نرمال فریتین نسبت به سطح بالای فریتین بر خطر ابتلا به سندروم متابولیک تأثیر گذار بود ($P = 0.045$ و $OR = 0.394$) به طوری که خطر ابتلا به سندروم متابولیک در افراد دارای سطح نرمال فریتین نسبت به افراد دارای سطح بالای فریتین کمتر بود.

کوواریانس استفاده گردید. در نهایت برای مدل بنده ای ارتباط متغیرهای مختلف بر سطح ترانسفیرین و فریتین از رگرسیون خطی چندگانه و یا در صورت لزوم از انواع رگرسیونهای غیر خطی و در آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، جداول توافقی، کای اسکور و شاخصهای آماری میانگین حسابی، میانگین هندسی، انحراف معیار، دامنه تغییرات و دامنه میان چارکی استفاده گردید.

یافته‌ها

مردان ۲۲/۶٪ مبتلایان و ۲۷/۴٪ غیر مبتلایان را تشکیل دادند. در حالی که زنان ۷۷/۴٪ مبتلایان و ۷۲/۶٪ غیر مبتلایان را شامل شدند. بر اساس نتایج آزمون مجدور کای بین دو عامل فوق (جنس و سندروم متابولیک) ارتباط معنی داری وجود نداشت.

در جدول ۱ ارتباط بین مشخصات نمونه ها از قبیل وضعیت دموگرافیک و اقتصادی اجتماعی با سندروم متابولیک دیده می شود. افراد مجرد ۱۳/۶٪ و افراد متاهل ۴/۸۶٪ مبتلایان به سندروم متابولیک را تشکیل می دهند.

بر اساس نتایج آزمون مجدور کای بین دو عامل فوق ارتباط معنی داری وجود دارد ($P < 0.001$).

محدوده سنی کمتر از ۲۰ سال ۱/۱٪، محدوده سنی ۲۹-۲۰ سال ۱۶/۹٪، محدوده سنی ۳۰-۳۹ سال ۲۶/۶٪، محدوده سنی ۴۰-۴۹ سال ۴۰/۱٪ و محدوده سنی بیشتر یا مساوی ۵۰ سال ۱۵/۳٪ مبتلایان به سندروم متابولیک را شامل می شوند.

بر اساس نتایج آزمون مجدور کای بین دو عامل فوق ارتباط معنی داری وجود دارد ($P < 0.001$).

جدول ۱. مقایسه وضعیت مشخصات دموگرافیک و اقتصادی-اجتماعی افراد مبتلا و غیر مبتلا به سندروم متابولیک

مجموع کل	وضعیت ابتلا به سندروم متابولیک		متغیر
	مبتلا	غیر مبتلا	
۹۵۰(۲۵۰/۱)	۴۰(۰/۲۲/۶)	۵۵(۰/۲۷/۴)	مرد
۲۸۳(۰/۷۴/۹)	۱۳۷(۰/۷۷/۴)	۱۴۶(۰/۷۲/۶)	زن
(۰/۴/۲)	۲(۰/۱/۱)	۱۴(۰/۷)	کمتر از ۲۰
۱۲۶(۰/۳۳/۳)	۳۰(۰/۱۶/۹)	۹۶(۰/۴۷/۸)	۲۰-۲۹
۱۰۰(۰/۲۶/۵)	۴۷(۰/۲۶/۶)	۵۳(۰/۲۶/۴)	۳۰-۳۹
۱۰۰(۰/۲۶/۵)	۴۷(۰/۲۶/۶)	۵۳(۰/۲۶/۴)	۴۰-۴۹
۳۵(۰/۹/۳)	۲۷(۰/۱۵/۳)	۸(۰/۴)	بیشتر یا مساوی ۵۰
۱۰۷(۰/۲۸/۳)	۲۴(۰/۱۳/۶)	۸۳(۰/۴۱/۳)	مجرد وضعیت تاهل
۲۷۱(۰/۷۱/۷)	۱۵۳(۰/۸۶/۴)	۱۱۸(۰/۵۸/۷)	متاهل
۱۰۸(۰/۲۸/۶)	۴۵(۰/۲۵/۴)	۶۳(۰/۳۱/۳)	کمتر از ۳۰۰۰
۱۸۸(۰/۴۹/۷)	۹۳(۰/۵۲/۵)	۹۵(۰/۴۷/۳)	۳۰۰۰-۶۰۰۰
۶۱(۰/۱۶/۱)	۳۱(۰/۱۷/۵)	۳۰(۰/۱۴/۹)	۶۰۰۰-۹۰۰۰
۲۱(۰/۵/۶)	۸(۰/۴/۵)	۱۳(۰/۶/۵)	بیشتر از ۹۰۰۰
۴۳(۰/۱۱/۴)	۳۲(۰/۱۸/۱)	۱۱(۰/۵/۵)	بی سود
۱۹۹(۰/۵۲/۶)	۱۰۵(۰/۵۹/۳)	۹۴(۰/۴۶/۸)	دیپلم یا کمتر
۱۳۶(۰/۳۶)	۴۰(۰/۲۲/۶)	۹۶(۰/۴۷/۸)	دانشگاهی
۸(۰/۲/۱)	۳(۰/۱/۷)	۵(۰/۲/۵)	سیگاری
۳۷۰(۰/۹۷/۹)	۱۷۴(۰/۹۸/۳)	(۰/۹۷/۵)	غیر سیگاری

جدول ۲. جدول توافقی افراد به تفکیک سطح فریتین و وضعیت ابتلا به سندروم متابولیک

مجموع کل	وضعیت ابتلا به سندروم متابولیک		متغیر
	مبتلا	غیر مبتلا	
(۰/۱۰۰) ۲۱	(۰/۵۲/۴) ۱۱	(۰/۴۷/۶) ۱۰	سطح پایین فریتین
(۰/۱۰۰) ۳۰۸	(۰/۴۸/۲) ۱۳۳	(۰/۵۶/۸) ۱۷۵	سطح طبیعی فریتین
(۰/۱۰۰) ۴۹	(۰/۶۷/۳) ۳۳	(۰/۳۲/۷) ۱۶	سطح بالای فریتین
(۰/۱۰۰) ۳۷۸	(۰/۴۶/۸) ۱۷۷	(۰/۵۳/۲) ۲۰۱	جمع کل

سندروم متابولیک در افرادی که سطح فریتین بالایی دارند نسبت به افرادی که سطح فریتین آنها پایین و نرمال است، بیشتر می‌باشد. مطالعات مقطعی مختلفی نشان دادند که سطوح بالای فریتین با چاقی شکمی (۱۴) پرفشاری خون (۱۵) و اختلالات لیپیدی خون (۱۶) در ارتباط هستند. همچنین در مطالعات قبلی مشاهده شد که شیوع سندروم متابولیک در افرادی که سطح گلوکز ناشتاپی بالایی دارند بیشتر است. در کل ارتباط مستقیمی بین دیابت نوع ۲ و سطح

بحث و نتیجه گیری

یافته های پژوهش کنونی ارتباط مستقیمی بین فریتین با سندروم متابولیک نشان می دهد. مطالعات قبلی در تأیید یافته های ما ارتباط مستقیمی را بین فریتین و سندروم متابولیک گزارش کرده اند به طوری که در مطالعات اخیر دیده شده است که افزایش سطح فریتین با افزایش شیوع سندروم متابولیک در ارتباط می باشد (۱۰-۱۳). نتیجه بدست آمده در این پژوهش نیز نشان داد که شیوع

توجه به این نکته لازم است که فریتین سرم یک پروتئین مثبت فاز حاد است و در شرایط التهابی افزایش می‌یابد. یک محدودیت مطالعه ما این بود که وضعیت التهابی افراد مورد بررسی قرار نگرفت. بنابراین شرایط التهابی افراد می‌تواند به طور مخدوش کننده‌ای سطح فریتین سرم افراد و در نتیجه ارتباط بین فریتین و سندروم متابولیک را تحت تاثیر قرار دهد اما در یک مطالعه مقطعی مشابه با اندازه‌گیری سطوح CRP، افراد دارای CRP بالا را از مطالعه خارج کردند. هر چند شواهد زیادی وجود دارد که آهن ممکن است متابولیسم گلوكز را تحت تأثیر قرار دهد. برای نمونه این احتمال وجود دارد که متابولیسم گلوكز ذخایر آهن بدن را تحت تأثیر قرار دهد. به این صورت که انسولین از طریق فعالسازی-Hypoxia-inducible Factor-1 ممکن است تولید اریتروپویتین و در نتیجه افزایش کفايت جذب آهن را سبب شود (۱۰).

در نتیجه می‌توان گفت که افزایش ذخایر آهن بدن که با شاخص فریتین بررسی می‌شود ممکن است با افزایش شیوع سندروم متابولیک ارتباط مستقیمی داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد فریتین سرم بعنوان شاخص ارزیابی روتین در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک در نظر گرفته شود.

تشکر و قدردانی

از کلیه شرکت کنندگان در مطالعه و همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی که حمایت مالی این طرح را بر عهده داشته اند تقدیر و تشکر می‌گردد.

فریتین دیده شده است (۱۷، ۱۸). دیابت نوع ۲ در بیماران مبتلا به هموکروماتوز شیوع بالایی دارد (۱۹). دو مطالعه ارتباط مثبت بین افزایش ذخایر آهن و دیابت را نشان دادند. این دو مطالعه به ترتیب بر روی مردان فنلاندی (۲۰) و پرستاران آمریکایی (۲۱) انجام شدند و هر دو شواهدی را در جهت اینکه افزایش فریتین در توسعه دیابت نقش دارد را بدلست آورdenد. به طوری که سطح فریتین سرم می‌تواند یک مارکر سندروم مقاومت به انسولین باشد و با انسولین سرم و مقاومت به انسولین ارتباط مستقیمی دارد (۱۷).

اگر چه پاتوژنز بین فریتین سرم و پیشرفت سندروم متابولیک به طور واضح مشخص نشده است ولی استرس اکسیداتیو و التهاب مزمن با مقاومت انسولینی نقش مهمی در سندروم متابولیک ایفا می‌کنند. تحت استرس اکسیداتیو افزایش فریتین سرم ممکن است از طریق سلوی یا بافتی باعث تخریب عمل انسولین شامل مقاومت انسولینی و غیر طبیعی شدن سلول‌های بتا پانکراس شود. آهن فلزی است که قادر به ایجاد آسیب‌های اکسیداتیو بافتی از طریق تشکیل رادیکال‌های آزاد می‌باشد و اضافه بار آهن هم به دلیل کاهش ترشح انسولین و هم ترشح نامناسب انسولین می‌تواند منجر به مقاومت به انسولین شود. نتایج تست تحمل گلوكز خوراکی در بیماران مبتلا به هموکروماتوز نشان داد که اضافه بار آهن در کبد نشان دادند که رسوب آهن در سلولهای بتای پانکراس باعث ترشح نامناسب انسولین می‌شود فریتین سرم یک شاخص بررسی آهن در مطالعات اپیدمیولوژیک است و به دقت تغلوت افراد را در میزان ذخایر آهن بدن بر اساس میزان سن و جنس بیان می‌کند (۲۲-۲۴).

References

1. Alberti KGMM, Eckle RH, Grundy SM, Zimmet PZ, Cleeman JI, Donato KA. Harmonizing the Metabolic Syndrome. *Circulation.* 2009; 120: 1640-1645.
2. Eckel RH. Establishing Clear Criteria for Metabolic Syndrome. *Physician's Weekly.* June 1, 2010.
3. Cornier MA, Dabelea D, Hernandez TL, Lindstrom RC, Steig AL, et al. The Metabolic Syndrome. *Endocr Rev.* 2008; 29:772-822.
4. Hosseinpoor Niazi S, Mirmiran P, Amiri Z, Azizai F. Association between legumes intake and metabolic syndrome among adults. *Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.* 2010;6: 594-602. (In Persian)
5. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the MS Among US Adults. *JAMA.* 2002; 287(3): 356-359.
6. Saadatian V, Gharre S, Shahkarami MT, Emadzadeh M, Taraz Jamshidi SH, Emadzadeh A. Survey of frequency rate of metabolic syndrome in women hospitalized in psychologic ward. *Journal of Medical School of Mashhad University of Medical Sciences.* 2011; 114: 230-237. (In Persian)
7. Vari IS, Balkau B, Kettanh A, Ande P, Tichet J, Fumeron F, et al. Ferritin and Transferin are associated with Metabolic Syndrome Abnormalities and Their Change Over time in a General Population. *Diabetes Care.* 2007;30(7):1795-1801.
8. Gee M,mahan LK, Escott-stumps. Clinical Biochemical Assesment in: Mahan LK, Escott stump Sk. Krause's Food and the Nutrition Care Process. Philadelphia: WB-saunders company; 2012:191-209.
9. Bozzini C, Girelli D, Olivieri O, Martinelli N, Bassi A. Prevalence of Body Iron Excess in the Metabolic Syndrome. *Diabetes Care.* 2005;28:2061-2063.
10. Jehn Megan, Clark Jeanne M, Guallar Eliseo. Serum ferritine and risk of the metabolic syndrome in U.S Adult. *Diabetes Care.* 2004; 27:2422-2428.
11. Liang S, Franco OH, Hu FB, Cai L, Yu Z, Li H, et al. Ferritin Concentration ,Metabolic Syndrome, and Type 2 Diabetes in middle-Aged and Elderly Chinese. *Endocr Care.* 2008;93(12):4690-4696.
12. Gonzalen AS, Guerrero DB, Soto MB, Diaz SP, Martinez-Olmos M, Vidal O. Metabolic syndrome, insulin resistance and the inflammation markers C-reactive protein and ferritin. *Eur J Clin Nut.* 2006;60:802-809.
13. Choi KM, Lee KW, Kim HY, Seo JA, Kim NH, Choi DS, et al. Association among serum ferritin, alanine aminotransferase levels and metabolic syndrome in Korean postmenopausal women. *Metabol Clin Exper.* 2005;54:1510-1514.
14. Gillum RF. Association of serum ferritin and indices of body fat distribution and obesity in Mexican American men—the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *Int J Obes Relat Metab Disord.* 2001; 25:639- 645.
15. Piperno A, Trombini P, Gelosa M. Increased serum ferritin is common in men

- with essential hypertension. *J Hypertens.* 2002;20: 1508-1513.
16. Williams MJ, Poulton R, Williams S. Relationship of serum ferritin with cardiovascular risk factors and inflammation in young men and women. *Atheroscler.* 2002;165:179-184.
17. Fernandez-Real JM, Ricart-Engle W, Arroyo E, Balanca R, Casamitjana-Alberta R, Cabrero D, et al. Serum ferritin as a component of the insulin Resistance syndrome. *Diabetes Care.* 1998; 1:62-68.
18. Ashourpour M, Jalali M, Djazaieri A, Saedi A, Taghdir M, Zarei M. Association between ferritin and glycemic status in person suffer from diabetes mellitus type 2 and health people. *Iran J Endocr Metabol.* 2010;12(3) : 231-236.
19. Witte DL, Crosby WH, Edwards CQ, Fairbanks VF, Mitros FA. Practice guideline development task force of the college of American Pathologists. Hereditary hemochromatosis *Clin Chem.* 1996;245(2) :139-200.
20. Salonen JT , Tuomainen TP, Nyssonnen K, Lakka HM, Punnonen K. Relation between iron stores and non-insulin dependent diabetes in men. *BMJ.* 1998;317(7160): 727.
21. Jiang R, Manson JE, Meigs JB, Ma J, Rifain N, Hu FB. Body iron stores in relation to risk of type 2 diabetes in apparently healthy women. *JAMA.* 2004; 291:711-717.
22. Furukawa S, Fujita T, Shimabukuro M. Increased oxidative stress in obesity and its impact on metabolic syndrome. *J Clin Inves.* 2004;114: 1752-1761.
23. Wilson JG, Lindquist JH, Grambow SC, Crook ED, Maher JF. Potential role of increased iron stores in diabetes. *Am J Med Sci.* 2003; 325: 332-339.
24. Ferrannini E. Insulin resistance, iron, and the liver. *Lancet.* 2000; 355: 2181-2182.